

Instruções de Preparação Intestinal Preparação Intestinal SuPrep

Uma limpeza adequada do cólon é essencial para uma colonoscopia de elevada qualidade. Seguir estes tipos de preparações irá ajudá-lo a alcançar uma limpeza completa.

Informe o seu médico responsável pela colonoscopia antes de tomar o preparado intestinal, se sofre de problemas renais, doenças cardíacas, diabetes ou problemas de hemorragia ou de coagulação.

Informe o seu médico responsável pela colonoscopia se estiver a tomar medicamentos anticoagulantes, incluindo Coumadin/warfarina, Plavix/clopidogrel, Eliquis/apixabano, Pradaxa/dabigatran, Brillinta/ticagrelor, Pletal/cilostazol ou Xarelto/rivaroxabano.

3-5 Dias Antes da Sua Colonoscopia

Recolha a receita médica de SuPrep que foi enviada para a sua farmácia.

O Dia Antes da Sua Colonoscopia

É importante beber bastantes líquidos durante o dia para não ficar desidratado e para que os laxantes tenham efeito (ver instruções incluídas sobre O Que Comer e O Que Não Comer antes de uma Colonoscopia)

Às 17 horas: Misture um (1) frasco de 6 onças de SuPrep líquido no recipiente de mistura. Adicione água fresca potável até à linha de 16 onças e misture. Beba a totalidade do líquido e, em seguida, beba mais dois (2) recipientes adicionais de 16 onças de água durante a hora seguinte.

Beba, pelo menos, mais 3 copos de 8 onças de líquidos transparentes durante o resto da noite. Pode beber mais, mas não menos.

No Dia da Sua Colonoscopia

Às _____ da manhã: Misture a segunda garrafa de 6 onças de SuPrep no recipiente de mistura com água potável fresca até à linha das 16 onças. Beba todo o líquido e dois (2) recipientes adicionais de 16 onças de água. Isto deve ser concluído 3 horas antes da hora do procedimento.

Não ingira mais nada por via oral no dia do procedimento, com excepção dos seus medicamentos matinais habituais (a menos que tenha recebido instruções para não os tomar).