

## **Instruções de Preparação Intestinal Preparação Intestinal NuLytle**

Uma limpeza adequada do cólon é essencial para uma colonoscopia de elevada qualidade. Seguir estes tipos de preparações irá ajudá-lo a alcançar uma limpeza completa.

Informe o seu médico responsável pela colonoscopia antes de tomar o preparado intestinal, se sofre de problemas renais, doenças cardíacas, diabetes ou problemas de hemorragia ou de coagulação.

Informe o seu médico responsável pela colonoscopia se estiver a tomar medicamentos anticoagulantes, incluindo Coumadin/warfarina, Plavix/clopidogrel, Eliquis/apixabano, Pradaxa/dabigatran, Brillinta/ticagrelor, Pletal/cilostazol ou Xarelto/rivaroxabano.

### **3-5 Dias Antes da Sua Colonoscopia**

Comprar/Recolher o preparado NuLytle na farmácia (foi receitado pelo seu médico).

### **O Dia Antes da Sua Colonoscopia**

É importante beber bastantes líquidos durante o dia para não ficar desidratado e para que os laxantes tenham efeito (ver instruções incluídas sobre O Que Comer e O Que Não Comer antes de uma Colonoscopia)

A partir das 16-17 horas: Beber três (3) litros da preparação NuLytle. É necessário beber os três litros no espaço de 2-3 horas para que a solução seja eficaz. Beba um copo de 8 onças aproximadamente a cada 10-15 minutos até que  $\frac{3}{4}$  da solução tenha desaparecido (o que corresponde a três litros).

### **No Dia da Sua Colonoscopia**

Beba o restante litro de NuLytle. Beba um copo de 8 onças a cada 10-15 minutos até que a solução desapareça. Isto tem de ser terminado três (3) horas antes da sua colonoscopia.

Acabe de beber a solução NuLytle em \_\_\_\_\_.

Não ingira mais nada por via oral no dia do procedimento, com excepção dos seus medicamentos matinais habituais (a menos que tenha recebido instruções para não os tomar).