

Instruções de Preparação

do Intestino Citrato de Magnésio Preparação do Intestino para o procedimento no mesmo dia

A limpeza adequada do cólon é essencial para uma colonoscopia de alta qualidade. Seguir estes passos irá ajudá-lo a obter uma limpeza completa.

Informe o médico que está realizando a colonoscopia antes de tomar a preparação intestinal se tiver problemas nos rins, doenças cardíacas, diabetes ou problemas com sangramento ou coagulação.

Notifique o médico que está realizando a colonoscopia se estiver tomando medicamentos para afinar o sangue, incluindo Coumadin/varfarina, Plavix/clopidogrel, Eliquis/apixaban, Pradaxa/dabigatran, Brillinta/ticagrelor, Pletal/cilostazol ou Xarelto/rivaroxabano.

3-5 dias antes da colonoscopia

Compre os seguintes medicamentos para a preparação intestinal:

- Dois (2) frascos de 10 onças de Citrato de Magnésia (NÃO vermelho)
- Dois (2) Simeticone (Gas-X) 180 mg comprimidos
- Dois (2) comprimidos de Dulcolax (bisacodil) 5mg

no dia anterior à colonoscopia

É importante beber bastante líquido ao longo do dia para que você não fique desidratado e para que os laxantes sejam eficazes (veja as instruções antes da colonoscopia o que pode comer ou não comer antes da sua colonoscopia)

No dia da colonoscopia

Às _____ **manhã**: Beba um frasco de 10 onças de Citrato de Magnésia e tome um comprimido de simeticone 180 mg junto com um copo de 8 onças de água ou líquido claro

Às _____ **da manhã**: Tome duas Comprimidos de Dulcolax (bisacodil) juntamente com um copo de 8 oz de água ou líquido claro.

Às _____ **am**: Beba um frasco de 10 oz de Citrato de Magnésia e tome um comprimido de simeticone 180 mg junto com um copo de 8 oz de água ou líquido claro. Isso deve ser concluído 3 horas antes do horário do procedimento.

Não há problema em beber líquidos claros 3 horas antes do horário do procedimento. **Sem líquidos / nada por via oral** começando 3 horas antes do horário agendado do procedimento.

